



CUPPER

REGISTRO SANITARIO: RSCO-138/III/23

1. PROPIEDADES FÍSICAS / ANÁLISIS GARANTIZADO

Apariencia: Líquido

Color: Verde

pH: 1.55 ± 1

Densidad: 1.14 gr/cm³

ALGACELL CUPPER es un producto que se aplica a baja concentración de forma preventiva; es decir, el uso de mililitros por litro de agua a utilizar en la aplicación foliar puede corregir las necesidades de cobre elemental en cultivos que demandan desde 7 hasta 25 ppm como nutriente vegetal.

Es una fórmula amigable y sin efecto de envejecimiento en las hojas debido al sol después de su aplicación.

Composición garantizada

Cobre (Cu)	10.0% (p/v)
Ácido Acetil Salicílico	0.02% (p/v)
Materia Orgánica	10.0% (p/v)

2. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO

Cultivo

Tomate, berenjena, chile, tomate verde, okra, papa, pimiento morrón, espárrago, maguey, pepino, melón, calabaza, calabacita, sandía, chayote, ajo, cebolla, cebollín, poro, menta, orégano, romero, chía, apio, cilantro, perejil, hinojo, zanahoria, alcachofa, lechuga, brócoli, col de bruselas, col, coliflor, acelga, berro, betabel, espinaca, amaranto, ornamentales.

Maíz, sorgo, cebada, avena, frijol, garbanzo, lenteja, chícharo, soya, centeno, trigo, arroz, ajonjolí.

Arándano, durazno, peral, ciruela, vid, uva de mesa, manzano, nogal, limón, naranja, lima, mandarina, toronja, mango, guayaba, café, rambután, aguacate, plátano, frambuesa, laurel, canela, zarzamora, mora azul, fresa, grosella, cidro, piña, papaya, almendra, castaña, avellana, nuez, nogal de castilla, nohal pecanero, carambola, maracuyá, granada, tabaco, agave, yuca, kiwi, abedul, nopal, tuna, xocoostle, ornamentales, y orquídeas.

Época de aplicación

Realizar tres aplicaciones vía foliar, la primera al momento de la aparición de las primeras deficiencias a los 25 días del trasplante. La segunda aplicación durante la época de floración y una tercera aplicación durante el amarre y cuajado de fruto.

Realizar dos aplicaciones vía foliar, la primera al momento de las manifestaciones de deficiencia durante el desarrollo vegetativo antes de la floración y la segunda durante el llenado de fruto.

Realizar tres aplicaciones vía foliar, la primera al momento de la aparición de las deficiencias en los primeros brotes, la segunda durante la floración y la tercera durante el cuajado y llenado de fruto.

Dosis

1.0, 1.5 Y 2.0 L/ha

1. Elaborar un programa de aplicación específico con apoyo de un asesor técnico Algacell.
2. Agitar vigorosamente el envase antes de abrir el producto.
3. Vertir en agua según la dosis recomendada y mezcle hasta obtener una solución homogénea.

3. EMBALAJE Y PRESENTACIÓN

Recipientes de plástico con las siguientes presentaciones:

1 L

5 L

10 L

20 L

4. CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto tiene una caducidad de 2 años. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase protegido de la luz solar directa. No se almacene junto con productos alimenticios. No se deje al alcance de los niños. Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

AGROPLASMA FERTICELL, S.A. DE C.V., garantiza la composición y contenido neto del producto siempre y cuando los sellos de seguridad de los envases no hayan sido violados. Debido a que el almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación del producto sale del alcance de AGROPLASMA FERTICELL, S.A. DE C.V., la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que pueda causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.